

Kortfattad översikt av inhalatorer som tillhandahålls av Chiesi

Trimbow beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium (BDP/FF/G)

INHALATOR	HÅLLBARHET*	FÖRPACKNING & VARUNUMMER	INNEHÅLL & STYRKA (µg)	INDICERAT VID	DOSERING
 Pulverinhalator NEXThaler (88/5/9)	6 veckor efter öppnande av foliepåse	• 1 x 120 doser nr 026496 • 3 x 120 doser nr 179955	BDP/FF/G 88/5/9	KOL & Astma	2 inhalationer 2 ggr dagligen
 Sprayinhalator (87/5/9)	4 månader i rumstemperatur	• 1 x 120 doser nr 449455 • 3 x 120 doser nr 395923	BDP/FF/G 87/5/9	KOL & Astma	2 inhalationer 2 ggr dagligen
 Sprayinhalator (172/5/9)	3 månader i rumstemperatur	• 1 x 120 doser nr 188056 • 3 x 120 doser nr 136040	BDP/FF/G 172/5/9	Astma	2 inhalationer 2 ggr dagligen

TRIMBOW BEHÖVER INTE SKAKAS

Översikten är inte avsedd att användas som forskrivarinformation.
För fullständig indikation, dosering och behandlingsrekommendation
vänligen se Trimbow produktresumé på fass.se



Trimbow®
beklometasondipropionat/
formoterolfumaratdihydrat/
glykopyrronium

* Hållbarheten avser förvaring i rumstemperatur efter öppnande. För pulverinhalatorn Nexthaler när den tagits ur skyddspåsen. Nexthaler är fuktkänslig och ska förvaras torrt. Spray kan förvaras i kylskåp men bör då tas ut några minuter innan användandet. Förvara flerpack spray i kylskåp.

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium), 87 µg/5 µg/9 µg respektive 172 µg/5 µg/9 µg per dos inhalationsspray, lösning. 88 µg/5 µg/9 µg per dos inhalationspulver. Rx. F. ATC-kod: R03AL09 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider.

Indikation: *Inhalationspulver respektive spray 87 µg/5 µg/9 µg:* Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta₂-agonist eller en kombination av en långverkande beta₂-agonist och långverkande muskarin-antagonist. Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta₂-agonist och en medelhög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.

Spray 172 µg/5 µg/9 µg: Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta₂-agonist och en hög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.

Varningar och försiktighet: Är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av sjukdom. Omedelbara överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilatorer och och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av

symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade under längre perioder. Behandling med beta₂-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Glykopyrronium bör användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller urinretention. För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja munnen, gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen. Synrubbing kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Rekommendationen är att behandling inte bör avbrytas abrupt. Doserna ska titreras till de lägsta doserna som bibehåller effektiv astmakontroll.

Graviditet och amning: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Trimbow under graviditet och förlösning. Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Trimbow under amning.

E-post: infonordic@chiesi.com För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2026-06-25.

Innovair® (beklometasondipropionat/formoterol), 100/6 µg per dos respektive 200/6 µg per dos inhalationsspray, lösning. RX. F.

Innovair nexthaler® (beklometasondipropionat/formoterol), 100/6 µg per dos respektive 200/6 µg per dos inhalationspulver. RX. (F) **Subventioneras endast för patienter med regelbunden behandling av bronkialastma, när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist) är lämplig.**

ATC-kod: R03AK08 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika, inhalationer.

Indikation:

Innovair®/Innovair nexthaler®: Regelbunden behandling av bronkialastma, när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist) är lämplig till patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och behovsmedicinering med inhalerad kortverkande beta2-agonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist.

Innovair®/Innovair nexthaler® 100/6 µg per dos: Indicerat även för symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 < 50 % av förväntat normal) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilatorer.

Scanna QR-koden
för att komma till
chiesipro.se



Innovair®/Innovair nexthaler® är indicerat för vuxna patienter.

Varningar och försiktighet: Innovair®/Innovair nexthaler® är inte avsedd för initial astmabehandling. Behandling med Innovair®/Innovair nexthaler® ska inte påbörjas under en exacerbation eller vid en akut eller markant försämring av astman. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilatorer och Innovair®/Innovair nexthaler® ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Behandling med beta2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Den lägsta effektiva dosen bör användas. Behandlingen bör inte avslutas abrupt. **Graviditet och amning:** Innovair®/Innovair nexthaler® ska endast användas under graviditet och amning om den förväntade nyttan överväger tänkbara risker. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se.

Datum för översyn av produktresumén: 2023-11-10 (inhalationsspray 100/6 µg samt 200/6 µg), 2020-09-03 (inhalationspulver 100/6 µg), 2020-06-15 (inhalationspulver 200/6 µg). Chiesi Pharma AB, telefon 08-753 35 20, www.chiesipharma.se.

Kortfattad översikt av inhalatorer som tillhandahålls av Chiesi

Innovair beklometasondipropionat/formoterol (BDP/FF)

	INHALATOR	HÅLLBARHET*	FÖRPACKNING & VARUNUMMER	INNEHÅLL & STYRKA (µg)	INDICERAT VID	DOSERING
Innovair 100/6	 Pulverinhalator NEXThaler	6 månader efter öppnande av foliepåse	• 1 x 120 doser nr 434425 • 3 x 120 doser nr 557438	BDP/FF 100/6	KOL & Astma	KOL: 2 inhalationer 2 ggr dagligen Astma: 1-2 inhalationer 2 ggr dagligen För vidbehovsbehandling se fass.se
	 Spray-inhalator	3 månader i rumstemperatur	• 1 x 120 doser nr 512891			
Innovair 200/6	 Pulverinhalator NEXThaler	6 månader efter öppnande av foliepåse	• 1 x 120 doser nr 048320 • 3 x 120 doser nr 449344	BDP/FF 200/6	Asthma	2 inhalationer 2 ggr dagligen
	 Spray-inhalator	3 månader i rumstemperatur	• 1 x 120 doser nr 033234			

INNOVAIR BEHÖVER INTE SKAKAS

Översikten är inte avsedd att användas som förskrivarinformation.

För fullständig indikation, dosering och behandlingsrekommendation vänligen se Innovair produktresumé på fass.se



Innovair®
beklometasondipropionat/
formoterolfumaratdihydrat